

Corona-Information

Katrin Baier / ärztliche Leiterin „Impfen“
Landkreis Börde

18. Januar 2022

Erarbeitet / zusammengestellt unter Bezug auf die entsprechenden aktuellen amtlichen Verlautbarungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bzw. der Ständigen Impfkommission des RKI (STIKO)

Corona-Schutz-Impfungen

„Fragen / Antworten / Quintessenzen“ (FAQ) / Stand 18. Januar 2022)

Wo kann man sich impfen lassen?

beim Hausarzt, Facharzt oder Betriebsarzt / an den dezentralen Impfstellen im Landkreis Börde

Gibt es im Landkreis Börde noch ein Impfzentrum?

Nein, das Impfzentrum des Landkreises ist seit 30.9.2021 geschlossen.

Kann man sich auch ohne Termin impfen lassen?

Nein, ab Dezember ist eine Impfung nur mit Terminvergabe möglich. Lediglich bei den eingesetzten Impfbussen sind Impfungen ohne Termin möglich.

Wie erfolgt die Vergabe von Impfterminen für die dezentralen Impfstellen?

Online-Buchung über die Internetseite des Landkreises Börde / über die landkreiseigene Telefonhotline 03904/ 72403960 / per Mail impfzentrum.terminvergabe@landkreis-boerde.de

Mit welchen Impfstoffen wird aktuell im Landkreis Börde geimpft?

Mit den mRNA-Impfstoffen Comirnaty® von BioNTech (ab 5 Jahre) und Spikevax® von Moderna (ab 30 Jahre)

Mit dem COVID-19 Vaccine Janssen® von Johnson&Johnson (zugelassen ab 60 Jahre)
Es ist gegenwärtig ausreichend Impfstoff vorhanden.

Kontakt:

Über Pressestelle / Uwe Baumgart
Bornsche Straße 2
39340 Haldensleben

Telefon: +49 3904 7240-1204
Telefax: +49 3904 7240-51204
E-Mail: presse@landkreis-boerde.de

Wie groß sind die Abstände zwischen erster und zweiter Impfung?

Zwischen der 1. und 2. Impfung sollten 3 bis 6 Wochen bei Comirnaty® von BioNTech bzw. 4 bis 6 Wochen bei Spikevax® von Moderna liegen.

Bei der 2. Impfung soll der gleiche Impfstoff, d.h. auch vom gleichen Herstellers verwendet werden wie bei der 1. Impfung.

Der Impfschutz ist vollständig 14 Tage nach erfolgter Zweitimpfung.

Der Vektorimpfstoff COVID-19 Vaccine Janssen® muss nur einmal verabreicht werden. Der Impfschutz ist vollständig 14 Tage nach erfolgter Impfung. Von der STIKO wird zur Verbesserung des Impfschutzes eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff ab 4 Wochen nach erfolgter Impfung empfohlen.

Können sich auch Kinder und Jugendliche impfen lassen?

Ja. Die STIKO empfiehlt die Impfung generell für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Die Impfung erfolgt mit dem Impfstoff Comirnaty® von BioNTech. Diese Altersgruppe erhält eine Impfdosis von 0,3 ml d.h. 30 µg.

Für Kinder zwischen 5-11 Jahren gibt es durch die STIKO keine generelle Impfeempfehlung.

Bei individuellem Wunsch von Kindern und Eltern bzw. Sorgeberechtigten kann die COVID-19- Impfung auch bei 5-11-jährigen Kindern ohne Vorerkrankungen nach ärztlicher Aufklärung erfolgen.

Die STIKO empfiehlt in dieser Altersgruppe (5-11 Jahre) die Impfung nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen, wie:

- Adipositas (>97. Perzentile des BMI)
- angeborene oder erworbene Immundefizienz oder relevante Immunsuppression
- angeborene zyanotische Herzfehler (O₂-Ruhesättigung < -1,64 für die forcierte Einsekundenkapazität (FEV₁) oder Vitalkapazität (FVC)
- schweres oder unkontrolliertes Asthma bronchiale
- chronische Nierenerkrankungen
- chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen
- diabetes mellitus, wenn nicht gut eingestellt bzw. mit HbA_{1c}Wert >9,0 %
- schwere Herzinsuffizienz
- schwere pulmonale Hypertonie
- syndromale Erkrankungen mit schwerer Beeinträchtigung
- trisomie 21
- tumor Erkrankungen und maligne hämatologische Erkrankungen

Mit welchem Impfstoff werden die Kinder zwischen 5-11 Jahren geimpft?

Die Impfung für Kinder zwischen 5-11 Jahren erfolgt mit dem Impfstoff Comirnaty® von BioNTech.

Der Impfstoff für diese Personengruppe kommt in einer anderen Packungsgröße und wird in anderer Verdünnung hergestellt. Die Kinder erhalten als Impfdosis 0,2 ml, d.h. 10 µg.

Wo können sich Kinder und Jugendliche in Anwesenheit einer erziehungsberechtigten Person impfen lassen?

Ab 12 Jahre beim Haus- oder Facharzt oder an allen dezentralen Impfstellen im Landkreis Börde. Ab 5 Jahre beim Haus- oder Facharzt.

Ab 5 Jahre mit Termin (Online-Buchung über die Internetseite des Landkreises Börde) ab 12.01.2022 jeden Mittwoch von 12:00 Uhr-18:00 Uhr im Landratsamt, Bornsche Straße 2, Haldensleben, Cafeteria

ab 18.01.2022 mit Termin jeden Dienstag 12:00 Uhr-18:00 Uhr DRK „Soziales Zentrum“, 39326 Wolmirstedt, Heinrich-Heine-Straße 5

ab 19.01.2022 mit Termin jeden Mittwoch von 12:00 Uhr-18:00 Uhr Kreisvolkshochschule, 39387 Oschersleben, Burgbreite 3

Impfung und Aufklärung durch Kinderarzt oder erfahrenen Haus-/ Facharzt vor Ort.

Können sich Schwangere impfen lassen?

Ja, die STIKO empfiehlt die Impfung allgemein ab dem 2. Trimenon der Schwangerschaft. Die Impfung erfolgt mit dem Impfstoff Comirnaty® von BioNTech.

Können sich Stillende impfen lassen?

Ja, die STIKO empfiehlt die Impfung mit dem Impfstoff Comirnaty® von BioNTech.

Wie erfolgt die Impfung von Genesenen?

Bereits an Corona-Erkrankte benötigen nur eine Impfung. In Regel erfolgt die Impfung 3 Monate nach Erkrankung, jedoch frühestens 4 Wochen Erkrankung und völliger Symptommfreiheit.

Welche geimpften Personen sollen eine Auffrisch-/Boosterimpfung erhalten?

Alle Personen ab 12 Jahren. Alle Personen, die nach COVID-19-Impfung eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben unabhängig vom Impfstatus. Alle Personen ab 5 Jahren mit Immundefizien.

Wann soll die Auffrisch-/Boosterimpfung erfolgen?

Bei immungesunden Personen ab 3 Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung. Bei immungesunden Personen, die eine Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson-Johnson) erhalten haben bereits ab 4 Wochen nach erfolgter Impfung.

Bei Personen, die nach COVID-19-Impfung eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben nach 3 Monaten, jedoch frühestens nach 4 Wochen bei völliger Symptommfreiheit.

Personen, die eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht und danach 1 Impfstoffdosis erhalten haben, frühestens 3 Monate nach der vorangegangenen Impfung.

Personen, die nach COVID-19-Impfung (unabhängig von der Anzahl der Impfstoffdosen) eine SARSCoV-2-Infektion durchgemacht haben ab 3 Monaten nach Infektion.

Bei schwer immundefizienten Personen ab 5 Jahren mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort bereits 4 Wochen nach der 2. Impfstoffdosis als Optimierung der primären Impfsreihe.

Wo werden Auffrisch-/ Boosterimpfungen durchgeführt?

In Haus- und Facharztpraxen.

Durch mobile Impfteams in den Pflegeeinrichtungen.

An dezentralen Impfstellen an verschiedenen Orten im Landkreis Börde.

Welche Impfstoffe werden für die Auffrisch-/Boosterimpfung verwendet?

mRNA-Impfstoffe, nach Verfügbarkeit

Comirnaty® von BioNTech (ab 5 Jahre)

Spikevax® von Moderna (ab 30 Jahre)

Für welche Personen wird derzeit keine Auffrischimpfung durch die STIKO empfohlen?

Für alle immungesunden Personen im Alter von 5-11 Jahren

Weitere Impfinformationen auf den Seiten des RKI / <https://www.rki.de>